

COMPARACION DE LOS SCORE CHA2DS2VA Y CHA2DS2VASC EN TROMBOEMBOLIA EN FIBRILACION AURICULAR

- Autor: tineo jose m, Rivero Tahara, Vaca Carlos, Ruth rodíguez, Quiroz Walder, López Lorena, Muntaner Juan
Centro de Cardiología, Tucumán, Argentina

1 INTRODUCCION

- La fibrilación auricular (FA) es la arritmia sostenida más frecuente y un importante factor de riesgo de accidente cerebrovascular isquémico.
- la evaluación en complicación tromboembólica en la FA con el score chadsva modificado en las últimas guías

2 OBJETIVO PRINCIPAL

- Evaluar scores CHA₂DS₂-VA y CHA₂DS₂-VASC en pacientes con FA.
- Analizar el impacto del sexo y edad en la estratificación del riesgo.

3 METODOS

- Estudio observacional, retrospectivo, descriptivo, transversal.
- Pacientes: 1138 (hombres: 549, mujeres: 489), entre 45-90 años, ingresados de abril 2019 a julio 2025.
- Se calcularon scores CHA₂DS₂-VASC y CHA₂DS₂-VA y se compararon.



4 RESULTADOS

- CHA₂DS₂-VASC: mayor puntaje en mujeres
- CHA₂DS₂-VA: elimina sexo femenino como factor
- CHA₂DS₂-VA redujo la indicación de anticoagulación en mujeres jóvenes sin otros factores de riesgo
- Disminuye en mujeres indicaciones de anticoagulación innecesaria
- Mayor prevalencia de alto riesgo en >75 años.
- Sin diferencias relevantes por sexo en CHA₂DS₂-VA


CONCLUSIONES

- El sexo femenino aumenta la puntuación de CHA₂DS₂-VASC.
- CHA₂DS₂-VA se puede evitar la sobre indicación de anticoagulación en mujeres.
- Optimiza uso de anticoagulación

Comparación por sexo



Promedio de scores por edad y sexo



Comparación por edad

